
















Clef de détermination de la principale faune du sol

Sans pattes Vers, larves d'insectes	3 paires de pattes Insectes et autres arthropodes		4 paires de pattes Arachnides	7 paires de pattes Isopodes	Plus de 7 paires de pattes Myriapodes	
					Chilopode (cent-pattes) 1 paire de pattes par segment	Diplopede (mille-pattes) 2 paires de pattes par segment
						
<p>Enchytraeidae Blanc-jaune 0,5 - 4 cm</p>	<p>Collembole Queue (<i>furca</i>) qui lui permet de sauter 0,1 - 0,6 cm</p>	<p>Perce-oreille Pince au bout de l'abdomen 1 - 2 cm</p>	<p>Acarien Possède des chélicères 0,4 - 0,8 cm</p>	<p>Cloporte 7 segments avec des pattes 1 - 2 cm</p>		
					<p>Halophilus (dans la litière) Min. 50 paires de pattes 2 - 5 cm</p>	<p>Lule S'enroule en spirale 1,5 - 6 cm</p>
<p>Ver de terre Rougeâtre avec un épaississement au niveau du clitellum 5 - 18 cm</p>	<p>Larve de coléoptère Plus de 6 segments abdominaux 2 - 3 cm</p>	<p>Fourmi Etranglement entre le thorax et l'abdomen 0,5 - 1,2 cm</p>	<p>Opilion Pattes fines et longues 0,5 - 1,2 cm</p>			
					<p>Lithobius (dans les pierres) 15 paires de pattes 2 - 5 cm</p>	
<p>Larve de mouche Corps allongé et segmenté 0,5 - 2 cm</p>	<p>Staphylin Ailes très courtes 0,5 - 0,8 cm</p>	<p>Carabe Pattes divisées en 5 parties 2 - 5 cm</p>	<p>Araignée Possède des chélicères 0,5 - 1,5 cm</p>			<p>Glomeris S'enroule en boule 0,8 - 2 cm</p>